


BANCO DE
SANGRE
CLÍNICA LAS CONDES

Informaciones a los donantes



DONA SANGRE

D O N A . . . V I D A

PUEDES SALVAR A TRES PERSONAS

ACÉRCATE AL BANCO DE SANGRE
DE CLÍNICA LAS CONDES,
EN EL PISO -1, EDIFICIO NARANJO.
HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A DOMINGO 8:00 A 18:00 HORAS



Afiliada a Johns Hopkins
Medicine International
para programas de
certificación y mejora
de calidad



La primera clínica con tres
acreditaciones de Joint
Commission International



Acreditación
Nacional

 **CLC**
Clínica Las Condes
VIVIR MEJOR



Test para VIH

Estimado Paciente:

A usted se le ha tomado una muestra para detectar la presencia de anticuerpos para el virus VIH en su sangre. Este virus produce una infección que puede llevar a una disminución de las defensas del organismo que lo hace propenso a cuadros infecciosos que rara vez se produce en una persona con inmunidad normal.

El resultado de su examen estará en un plazo de dos días. A veces se requiere de test adicionales para llegar a resultados definitivos y confiables y en estos casos se pide una segunda muestra sin que esto se asocie a un resultado positivo o negativo de su examen. La entrega del resultado puede tardar hasta dos semanas.

Pacientes y Familia

Las vías de transmisión del virus VIH son:

1.Sanguínea: la que puede ser a través de una transfusión o por el uso de agujas contaminadas, por ejemplo: al inyectarse drogas compartiendo agujas.

2.Sexual: entre homosexuales (personas del mismo sexo) o heterosexuales (personas de diferente sexo).

3.Perinatal:

Madre a hijo durante el embarazo

Madre a hijo en el momento del parto

Madre a hijo a través de la leche materna

El virus **NO** se transmite por compartir actividades de la vida cotidiana en el trabajo o en el hogar, por usar elementos comunes como vasos, cucharas, platos, baños, etc., por dar un abrazo o dar la mano. El virus tampoco se transmite por picadura de insectos.

¿Cómo prevenir el contagio?

- No intercambiar agujas y jeringas, por ejemplo: en el uso de drogas intravenosas.
- Teniendo relaciones con una pareja estable, mutuamente fiel y seguros de no estar contagiados.
- En relaciones sexuales con más de una pareja protegiéndose con el uso correcto del condón.

